

P R O G R A M A



ENSINO



PESQUISA



EXTENSÃO



<http://astroesul.wixsite.com/astronomia> |



<https://www.facebook.com/astroESUL/> |



astroesul@gmail.com


AstroBioGeoChemistry: Organic Molecules in Active Galaxies

Dinalva A. Sales¹

astroESUL²

¹Universidade Federal do Rio Grande; ²Várias instituições

Where I came from ...





Rio Grande city



**Federal University of Rio Grande
FURG**

astroESUL

É um programa criado com o objetivo de desmistificar a astronomia, estimulando a sociedade para a busca de conhecimentos nesta área e facilitando o acesso ao tema por meio de projetos de ensino, pesquisa e extensão, idealizado e liderado pela Profa. Dra. Dinalva Aires de Sales do Instituto de Matemática, Estatística e Física - IMEF, da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, no extremo Sul do Brasil.



ENSINO



PESQUISA



EXTENSÃO



ENSINO

Astronomia como Ferramenta Lúdica para o Ensino de Física

Este projeto objetiva contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem nas disciplinas de física geral da FURG, utilizando os fenômenos astronômicos como ferramenta lúdica para induzir o pensamento investigativo dos alunos, explicitando conceitos, elucidando dúvidas, disponibilizando estratégias de resolução de exercícios através dos materiais produzidos pelo grupo do projeto.

Pré-Física

O componente curricular de Física Geral, da área de conhecimento Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, está presente de forma necessária e imprescindível na matriz curricular dos cursos de física ofertados pelo Instituto de Matemática, Estatística e Física (IMEF) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). O professor deste componente curricular precisa estar preparado para enfrentar as dificuldades de entendimento dos conteúdos relacionados aos programas das disciplinas, bem como das suas aplicações tecnológicas, frequentemente presentes no próprio cotidiano dos discentes e que passa despercebido. Portanto, este projeto tem como principal objetivo atender "in-loco" os alunos das disciplinas de Física Geral no processo de resolução de problemas, assim, oportunizará e potencializará o processo do ensino-aprendizagem para preencher as lacunas

Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 42, e20190054 (2020)

www.scielo.br/rbef

DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2019-0054>

Pesquisa em Ensino de Física



Licença Creative Commons

Astronomia como ferramenta lúdica para o ensino de física: teoria cinética dos gases através de aglomerados de estrelas

Astronomy as a playful tool for physics teaching: kinetic theory of gases through star clusters

Walas Silva-Oliveira^{*1}, Dinalva A Sales¹, Matheus J Lazo¹

¹Universidade Federal do Rio Grande, Instituto de Matemática, Estatística e Física, Rio Grande, RS, Brasil

Espaço de Aprendizagem Cooperativa de Mat., Est. e FÍSICA

SALAMat

SALAFís+Est



Projeto de Ensino

[PRÉ] FÍSICA

Profa. Dra. Dinalva A. Sales



EXTENSÃO

Estendendo o astroESUL

O principal objetivo deste projeto é promover observações do céu em Rio Grande/RS, assim como ministrar palestras e oficinas voltadas à comunidade universitária, escolar e público em geral da seguinte forma: promovendo oficinas sobre fases lunar, eclipse e estações do ano; realizando palestras sobre mapeamento do céu noturno; promovendo exposições de astrofotografia, com as fotos produzidas pelas observações; apresentando planisférios e tecnologias como softwares e simuladores voltados para a astronomia; e, promovendo a relação dialógica entre a universidade e sociedade.





PESQUISA

1) Galáxias com Emissão de Megamaser de OH como Traçadoras do Núcleo Ativo de Galáxia

O objetivo principal deste estudo é relacionar o estado de fusão das galáxias megamaser de OH à fase de evolução e crescimento do núcleo ativo de galáxias, formação estelar, bem como, a concentração e estrutura do gás ionizado da região central das galáxias, com dados dos telescópios Hubble, Gemini, VLA-A, IRTE, WHT e Herschel.

2) Moléculas Orgânicas em Galáxias

O projeto de pesquisa objetiva compreender a evolução química das moléculas orgânicas de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs) observadas nas galáxias contribuindo para melhorar nosso conhecimento sobre a origem e presença da vida na Terra e no Universo.

3) Laboratório de Ciência de Imagens

O laboratório de ciência de imagens tem como principal objetivo utilizar metodologias matemáticas robustas, como transformadas de Fourier e Wavelets, para tratar dados de imagens seja elas de origem geofísica, obtidas pelos satélites na plataforma espacial da NASA, e/ou de origem astrofísica como dados obtidos pelos telescópios espaciais e em Terra. Este laboratório está em consonância com a nova era de profissões do século XXI, cuja missão é conseguir trabalhar com "Big Data" e extrair informações úteis para o avanço da ciência e também para a transferência de tecnologia. Este projeto está em sinergia e contribui diretamente com a missão da FURG que é o estudo do ecossistemas costeiros e oceânicos.

What are the fundamental questions?

Over the next decade we can expect to make great strides in addressing the three grand challenges of molecular astrophysics:

- (1) How can we use molecules to study the Universe?
- (2) What is the role of molecules in the evolution of the Universe?
- (3) What is the organic inventory of space and how does that relate to the prebiotic origin of life?




Summary

- 1° - AstroBiology → Motivation and high spatial resolution
- 2° - AstroChemistry → How can we observe and study molecules in the Universe?
- 3° - AstroGeo → How can we use it to solve issue in the Earth?

AstroChemistry

The study of molecular processes in space.

- Types of chemical reactions in space
- Which reactions occur under which conditions
- Chemical composition of astrophysical objects
- to infer the physical properties
- Links to Astrobiology



A multi-field approach

Observations

- infrared
- radio
- visual / UV
- X-rays


Models

- early universe
- interstellar clouds
- star-forming regions
- planetary atmospheres

Laboratory / computation

- spectroscopy
- collision rates
- reaction rates
- grain surface processes

Penetrates Earth's
Atmosphere?



Radiation Type
Wavelength (m)

Radio

10^3



Buildings

Microwave

10^{-2}



Humans

Infrared

10^{-5}



Butterflies

Visible

0.5×10^{-6}



Protozoans

Ultraviolet

10^{-8}



Molecules

X-ray

10^{-10}



Atoms

Gamma ray


10^{-12}




Atomic Nuclei

Approximate Scale
of Wavelength

Frequency (Hz)



Temperature of
objects at which
this radiation is the
most intense
wavelength emitted



1° Astrobiology - Line forests




Fig: HIFI spectral survey of the Orion KL region. Top panel: The complete spectral scan (490 GHz to 1.9 THz) reveals the rich line forest. There are some 105 lines in this spectrum. Middle panel: A zoom in on the 490–530 GHz spectral range with some of the stronger lines identified. Bottom panel: The 522.5–525.5 GHz range shows velocity-resolved lines. The numbered lines are CH_3OH lines used in the analysis of the temperature structure of the region (Tielens 2013).


COMs - Complex Organic Molecules

- molecules with 6 or more atoms including C (Herbst & van Dishoeck 2009)

- CH_3OH , CH_3CN , CH_3CHO , CH_3OCH_3 ,

- Prebiotic molecules
 - NH_2CHO (formamide)


- Benzene




BENZENE




Cernicharo et al 2001 (ISO)




Search for interstellar emission of N-heterocycles




Benzene




Pyrimidine



Uracil



Thymine




Cytosine

- Motivation → prebiotic chemistry
- Formation of nucleobases
- Presence in meteorites (e.g. Murchison)
(Allamandola et al. 1999, Martins et al. 2005, 2008)
- Large dipole moments → detection at radio wavelengths (Charnley et al. 2005)

Fig.: Molecular structure of benzene, pyrimidine and pyrimidinic nucleobases uracil, thymine and cytosine (Mendoza et al. 2013).

N-heterocycles (tentatives of) detection in ISM

- Vinyl cyanide, pyrimidine and pyridine in 1973 (Martha Simon & Michal Simon, 1973)
- Pyridine, pyrimidine, quinoline, isoquinoline (Charnley et al. 2005, Kuan et al. 2006)
- Benzonitrile!
(Mcguire et al. 2019)



Still a challenge:

- Low abundances
- Photodissociation





Fig.: The half-lives of the three N-heterocycles plotted against the number of nitrogen atoms in the ring. (Z. Peeters et al. 2005).

Green Bank Discovers Many Complex Molecules Never Before Seen In Space

Source: Green Bank | Posted March 18, 2021 10:46 PM | 0 Comments



Series of 9 papers!!

GOTHAM


Green Bank Telescope
Observations of TMC-1: Hunting
Aromatic Molecules

<http://astrobiology.com/2021/03/geen-bank-discovers-man-complex-molecules-never-before-seen-in-space.html>


TMC - 1

- very early evolutionary phase (precollapse)
- source of unsaturated carbon-chain molecules
- **evidence** of five-membered and bicyclic CN-functionalized rings


→ unexplored area of organic chemistry in space




cyanobenzene




1-cyano-1,3-cyclopentadiene



2-cyano-1,3-cyclopentadiene



1-cyanonaphthelene



2-cyanonaphthelene

Figure 1: Structures and common chemical names of the five aromatic or cyclic molecules that have recently been discovered in the dark molecular cloud TMC-1 on the basis of precise laboratory rest frequencies using the 100 m Green Bank Telescope.

Search for N-heterocycles precursors


- HNCO, HC₃N, C₃H and HC₃NH⁺

(Majumdar et al. 2015)


- Formamide

- Vinyl cyanide (C₂H₃CN)


(Parker & Kaiser, 2017)



Formamide




protons (170 MeV)
meteorite, 243 K




R=R₁=H; uracil (1)

R=Me; R₁=H; thymine (3)

R=H; R₁=COOH; orotic acid (10)



cytosine (2)




R=NH₂; R₁=H adenine (4)

R=OH; R₁=NH₂ guanine (5)


R=R₁=H purine (6)

R=OH; R₁=H hypoxanthine (8)


R=R₁=NH₂ 2,6-diaminopurine (9)



4-AMI (16)




isocytosine (7)




R=OH 4,6-DHP (11)


R=H 4(3H)pyrimidone (12)



3(OH)pyridine (13)



AHMN (14)



DAMN (15)

Products of high-energy proton irradiation of formamide in the presence of meteorites. Nucleobases, nucleobase analogs, and intermediates of the condensation (Saladino et al; 2015).





Formation of HNCO

- Gas phase reactions do not reproduce the observations

- GRAIN REACTIONS

Interstellar ice analogues processed
by proton or UV radiation

(Fedoseev et al. 2015)



HNCO and NH₂CHO

- $[\text{HNCO}]/[\text{NH}_2\text{CHO}] \sim 3.0$
(e.g. Mendoza et al. 2014)
- They may share a common solid state formation scheme
(Haupa et al. 2019)







Figure 7. Comparison of molecular abundances for NH₂CHO and HNCO in a sample of Galactic sources. Filled symbols indicate our values measured towards the protostellar shocks B1 and B2. The data were taken from by Jackson, Armstrong & Barrett (1984), Sutton et al. (1995), Bisschop et al. (2007), Martín et al. (2008), and Halfen et al. (2011). The best power-law fit $[\text{HNCO}] = 3.0 \times [\text{NH}_2\text{CHO}]^{0.97}$ is drawn in dashed.

Comets, asteroids and meteorites

67P/Churyumov-Gerasimenko

- Rosetta/Philae mission
- glycine



2021 Census of Interstellar, Circumstellar, Extragalactic, Protoplanetary Disk, and Exoplanetary Molecules

BRETT A. MCGUIRE^{1, 2, 3}

¹*Department of Chemistry, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, USA*

²*National Radio Astronomy Observatory, Charlottesville, VA 22903, USA*

³*Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, MA 02138, USA*


ABSTRACT

To date, 241 individual molecular species comprised of 19 different elements have been detected in the interstellar and circumstellar medium by astronomical observations. These molecules range in size from two atoms to seventy, and have been detected across the electromagnetic spectrum from cm-wavelengths to the ultraviolet. This census presents a summary of the first detection of each molecular species, including the observational facility, wavelength range, transitions, and enabling laboratory spectroscopic work, as well as listing tentative and disputed detections. Tables of molecules detected in interstellar ices, external galaxies, protoplanetary disks, and exoplanetary atmospheres are provided. A number of visual representations of this aggregate data are presented and briefly discussed in context.


Keywords: Astrochemistry, ISM: molecules

Census of molecules (McGuire+2021)


Carbon Stars




Dark Clouds




LOS Clouds




SFRs




Molecule Types





Census of molecules (McGuire+2021)




2° - AstroChemistry


Galaxies ...

It is a huge system of gas (~10%), dust (1%), billions/trillion of stars and dark matter all held together by gravity.


It can be considered as “**fundamental blocks**” of the Universe.



(1) How can we use molecules to study the Universe?



Active Galaxies



Active Galactic Nuclei – SMBH $10^4\text{--}7(M_\odot)$


Star Formation Rate
Milk Way $\sim 3 M_\odot/\text{ano}$
Starburst $> 100 M_\odot/\text{ano}$



Starburst

Carl Seyfert (1943, ApJ, 97, 28) are characterized by extremely bright nuclei ($\sim 10^{11} L_{\odot}$).

Seyfert 1 – BLR (FWHM $\sim 5000 \text{ km/s}$) + NLR (FWHM $\sim 500 \text{ km/s}$)



Seyfert 2 – NLR (FWHM $\sim 500 \text{ km/s}$)





Image taken from https://ned.ipac.caltech.edu/level5/Glossary/Essay_seyfert.html

AGN Unified Model

Antonucci & Millher (1985, ApJ, 297, 621)



Tristram et al. 2014




Figure taken from Zier & Biermann (2002, A&A, 396, 91)

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)

First observation was performed by Gillett et al. (1973)

First physical and chemical properties (Puget & Leger (1989); Allamandola (1989))




Figure taken from Gillett et al. (1973)






Figure taken from Hunt et al. (1950)

Signature of the molecules in the MIR




Star-Forming Cloud in Cepheus

Spitzer Space Telescope • IRS

(1) How can we use molecules to study the Universe?

PAHs and Astrobiology

- Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH)
- 20% or more of the carbon in the ISM (Joblin et al., 1992)
- 50% of the mid-IR luminosity (Li et al., 2004)
(3.3, 6.2, 7.7, 8.6, 11.3 and 12.7 μm)
- Star formation tracers
(Tielens et al. 2008)



Naphthalene $C_{10}H_8$


(2) What is the role of molecules in the evolution of the Universe?

PAHs and Astrobiology


- Prebiotic role
- PANH




The Aromatic World
(Ehrenfreund et al. 2006)




RNA



TNA




GNA




PNA

See Canelo, Friaça, Sales et al. 2008, MNRAS, 475, 3746
Canelo, Sales, Friaça et al. 2021, accepted



Structures of PAHs





a) Compact Pericondensed




b) Edged Pericondensed




c) Not Branched Catacondensed



d) Branched Catacondensed




e) Irregular



f) 5-7 Defects




g) Completely Dehydrogenated





h) PANH

Different kinds of PAH structures (Andrews et al., 2015)



Proposed evolution of PAHs and carbonaceous molecules (Andrews et al., 2015)




Bouwman+2010, ApJ, 723, L243




Audibert, Riffel, Sales +2017, MNRAS, 464, 2139



Size and Charge of the PAHs



Draine e Li (2001, 2007a,b)





Peeters+2002

PAH Normal Modes




PAH molecule



Peeters

Hony


Charge of the PAHs



Bauschlicher, Peeters & Allamandola (2009)

Motivation


It has been claim that PAHs is destroyed in AGN host galaxies



Smith+2007

The sample and data reduction observed by Spitzer telescope


- 186 galaxies (AGNs+SB+HII) observed by Spitzer IRS;
- 5 – 14 μm wavelength range;
- Emission line fit using PAHFIT code (Smith+2007);
- Stellar continuum with $T=5000\text{K}$;
- Thermal continuum with $T= 35 - 300\text{K}$;
- Ionic lines and molecular hydrogen (H_2);
- PAH bands.



Telescópio Espacial Spitzer




Infrared Spectrograph (IRS)



O que já
aprendemos de
PAHs em
Galáxias?


Será que PAHs são
destruídos em
Galáxias Ativas?




Sales+2010 – 100 AGNs e 86 Starburst


O que já aprendemos de PAHs em Galáxias?

Será que PAHs são destruídos em Galáxias Ativas?






Sales+2010 – 100 AGNs e 86 Starburst



NGC1808






O que já aprendemos de PAHs em Galáxias?

Será que PAHs são destruídos em Galáxias Ativas?





Sales+2012 | Gemini (8m) | $\sim 2 \times 10^{14}$ km
Alonso-Herrero+2014 | $\sim 3 \times 10^{14}$ km





N_0 – clumps along a radial equatorial ray
 τ_v – visual optical depth of individual clumps
 $Y = R_0/R_d$ – radial torus thickness
 r^{-q} – radial distribution power law exponent
 σ – torus angular distribution
 i – observe view angle

Voit 1992a, Voit 1992b –
 $N_H \sim 10^{23} \text{ cm}^{-2}$

$N_H \sim 1.5 \times 10^{24} \text{ cm}^{-2}$
 $i = 90^\circ, r^{-1.5}, R_0/R_d = 10, R_0 = 5 \text{ pc}$

Audibert, Riffel, Sales +2017, MNRAS, 464, 2139

Emissão $11.3\mu\text{m}$ PAH no centro de AGN



Silva, Krabbe, Canelo, Monteiro, Sales et al. 2021, MNRAS aceito

What actually I want to say ...



AGN




Torus

Stars




PAHs


Emissão $11.3\mu\text{m}$ PAH no centro de AGN



GrandPAHs – Tielens 2018



Andrews et al. 2015





Qual é o maior desafio na decomposição de um sinal??



Pensando em Big Data
Telescópio Espacial James Webb
Grandes telescópios (d=40m, LSST, GMT)

Decomposição de um sinal

Usando Fast Fourier Transform (FFT) | Transformada de Fourier Rápida



Transformada Discreta de Fourier

Receita da frequência =

Somar

Contribuições para esta frequência, de cada pico no tempo

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot e^{-i2\pi kn/N}$$

$$x_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X_k \cdot e^{i2\pi kn/N}$$

$N \rightarrow$ número de amostras de tempo que temos.

$n \rightarrow$ amostra atual que estamos considerando

$x_n \rightarrow$ valor do sinal de n

$k \rightarrow$ frequência

$X_k \rightarrow$ quantidade da frequência k no sinal
(amplitude e fase, um número complexo).

Ponto no tempo =

Somar


Contribuições para este ponto no tempo, de cada frequência

Transformada Discreta de Fourier


$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot e^{-i2\pi kn/N}$$

$$x_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X_k \cdot e^{i2\pi kn/N}$$

Dois Caminhos, Mesmo Resultado



Descrever um Caminho Circular



Transformada Discreta de Fourier

$$X_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-i2\pi k \frac{n}{N}}$$

Para encontrar a energia em certa frequência, gire o seu sinal ao redor de um círculo naquela frequência, e tome a média de um monte de pontos ao longo do caminho.

Vetor com
auto-valores

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot e^{-i2\pi kn/N}$$

$$x_n = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X_k \cdot e^{i2\pi kn/N}$$

Vetor com
auto-vetores

Desafio!!!


A multiplicação de 2 pontos se
comporta como N^2

$$10^2 = 100$$


Análise química das moléculas de PAHs em Galáxias Starburst (~230 objetos)



**Moléculas teóricas
700 espécies**




C₃₈₄H₄₈




Espinoza, Sales, Canelo e Matoso (2021 in prep.)

Análise química das moléculas de PAHs em Galáxias Starburst (~230 objetos)




Espinoza, Sales, Canelo e Matoso (2021 in prep.)


PAHs de 31 à 150C Vs. Galáxias




PAHs de 151 à 225C Vs. Galáxias




PAHs de 226 à 300C Vs. Galáxias



PAHs com menos de 30C Vs. Galáxias




PAHs com mais de 300C Vs. Galáxias




**Composição das
moléculas de PAHs
em
Galáxias Starburst
(~230 objetos)**

**Espinoza, Sales, Canelo e Matoso (2021 in
prep.)**


PAHs de 31 à 150C Vs. Galáxias




PAHs de 151 à 225C Vs. Galáxias




PAHs de 226 à 300C Vs. Galáxias



PAHs com menos de 30C Vs. Galáxias




PAHs com mais de 300C Vs. Galáxias



Composição das moléculas de PAHs em Galáxias Starburst (~230 objetos)

- Muitas moléculas pequenas (<30C), mas com pouca contribuição (auto-valor)
- Poucas moléculas grandes (>300C), mas com intensa contribuição (auto-valor)

Espinoza, Sales, Canelo e Matoso (2021
in prep.)



Composição das moléculas de PAHs em Galáxias Starburst (~230 objetos)

- Muitas moléculas pequenas (<30C), mas com pouca contribuição (auto-valor)
- Poucas moléculas grandes (>300C), mas com intensa contribuição (auto-valor)

Espinoza, Sales, Canelo e Matoso (2021 in prep.)

• PAH profile variations -
Peeters' classes
(Peeters et al. 2002,
2005)

• $F_{7.6}/F_{7.8} > 1 \rightarrow$ class A

• *Class A 6.2 $\mu\text{m} \rightarrow$ PANHs
(Hudgins et al. 2005)

• Another reservoir of N
(e.g. Canelo 2016)

15264-96559





Fig.: Overview of possible variations in the profile of the PAH bands 6.2, 7.7 and 8.6 μm , divided into three classes - A, B and C (Peeters et al., 2002; van Dienenhoven et al., 2004).

6.2 μm PAH band

Object IRAS10594+3818 - 6.2 μm band



- Or another feature?

Object IRAS_09116+0334 - 6.2 μm band





Fig.: Profiles of the 6.2 μm band for two sources using two Gaussians (Canelo et al. 2018).



- more class B sources in higher redshifts

- possible PAH evolutionary timescale

(e.g. aromatic evolution in stellar lifecycle, Shannon & Boersma, 2019)


Fig.: Distribution of the PAH bands into Peeters' classes according to the galaxies redshift (Canelo et al. 2018, 2021).

A inovação a partir do [enter]

<https://inoventerfurg.wixsite.com/inoventer>

Fanpage @inoventer

Instagram @inoventer.official




INOV[ENTER]



A tecnologia dos satélites a serviço a sociedade

Plataforma de Monitoramento Online



Capaz de fornecer informações sobre compostos moleculares através de imagens, gráficos, séries históricas (olhando para o passado e projetando o futuro) e relatórios combinados, como por exemplo:

- cidade, região, localização específica;
- composto desejado;
- períodos passados e atuais;
- limites permitidos e excedentes, conforme a legislação.



INOV[ENTER]



Time



Astrofísica

Profa. Dra. Dinalva Aires de Sales



Químico Analítico

Prof. Dr. Ednei Gilberto Primel



Físico-químico

Prof. Dr. Felipe Kessler



Administradora

Daniele Rodrigues Garcia



INOV[ENTER]



Reconhecimento



Ganhadora 2020



Profa. Dra. Dinalva A. Sales
FURG/IMEF



Parceiros(as) do astroESUL

PESQUISADORES:

Dr. Alan Alves Brito - UFRGS | Porto Alegre/RS | Brasil
 Dr. Alberto Rodríguez Ardila - LNA | Itajubá/MG | Brasil
 Dr. Amâncio Friaça - USP | São Paulo/SP | Brasil
 Dr. Andrew Robinson - RIT | Rochester/NY | USA
 Dr. Chris O'Dea - University of Manitoba | Winnipeg | CA
 Dr. Daniel Silveira - FURG | Rio Grande/RS | Brasil
 MSc. Eliane Cappelletto - FURG | Rio Grande/RS | Brasil
 Dr. Felipe Kessler - FURG | Rio Grande/RS | Brasil
 Dra. Hekatelyne Carpes - UFSM | Santa Maria/RS | Brasil
 Dr. Jack Gallimore - Bucknell University | Lewisburg/PA | USA
 Dr. Jacques Lepine - USP | São Paulo/SP | Brasil
 Dr. Juliano Vicenti - FURG | Rio Grande/RS | Brasil
 Dr. Luis Colina Robledo - CAB | Madrid | ES
 Dra. Miriani Pastoriza - UFRGS | Porto Alegre/RS | Brasil
 Dra. Preeti Kharb - IIAP | Bangalore | Índia
 Dra. Rafael Araujo - FURG | Rio Grande/RS | Brasil
 Dr. Rogemar Riffel - UFSM | Santa Maria/RS | Brasil
 Dra. Stefi Baum - University of Manitoba | Winnipeg | CA
 Dra. Thaisa Storchi Bergmann - UFRGS | Porto Alegre/RS | Brasil
 Dr. Valmir Heckler - FURG | Rio Grande/RS | Brasil

ALUNOS DE GRADUAÇÃO:

Ana Beatriz Minari - FURG | Rio Grande/RS | Brasil
 Bruna Apolinario Dias | Rio Grande/RS | Brasil
 Caroline Vanessa Bauman Bertti | Rio Grande/RS | Brasil
 Cristian Debortoli | Rio Grande/RS | Brasil
 Gabriela Garcia | Rio Grande/RS | Brasil
 Henrique Domingues Hirsch | Rio Grande/RS | Brasil
 Jonathan Alves dos Santos | Rio Grande/RS | Brasil
 Juliana Flores da Silva | Rio Grande/RS | Brasil
 Lucas Gregolon - FURG | Rio Grande/RS | Brasil
 Priscila Coelho - FURG | Rio Grande/RS | Brasil
 Victor Orsi Fadel | Rio Grande/RS | Brasil
 Vitor das Neves Avelaneda | Rio Grande/RS | Brasil
 Wesley Alberto de Farias | Rio Grande/RS | Brasil

ALUNOS DE MESTRADO:

Dr. Jean Marcel Espinoza - FURG | Rio Grande/RS | Brasil
 Wallas Silva - FURG | Rio Grande/RS | Brasil
 Lara Gatto - FURG | Rio Grande/RS | Brasil
 Brenda Matoso - FURG | Rio Grande/RS | Brasil

ALUNOS DE DOUTORADO:

MSc. Carla Canelo - USP | São Paulo/SP | Brasil
 Msc. Willian Rubira - FURG | Rio Grande/RS | Brasil

CONSULTORA ORGANIZACIONAL DO PROGRAMA:

Adm. Daniele Garcia - FURG | Rio Grande/RS | Brasil









IMEF


INSTITUTO DE
MATEMÁTICA,
ESTATÍSTICA E FÍSICA



astro
E SUL

Astronomia no
Extremo SUL





Qual é o maior desafio na decomposição de um sinal??



Pensando em Big Data
Telescópio Espacial James Webb
Grandes telescópios (d=40m, LSST, GMT)

Decomposição de um sinal

Usando Fast Fourier Transform (FFT) | Transformada de Fourier Rápida

A interpolação de 2 pontos se comporta como N^2 Cooley & Tukey (1965) soluciona como $2N \log_2(N)$

$$10^2 = 100$$

$2 \times 10 \times \log_2(10) = \underline{66.438561897747252}$

The calculator interface shows the result 66.438561897747252 in the display. The keypad includes functions like 2nd, const, e, [::], x, (, , ,), ^, ^x, 7, 8, 9, ÷, C, sin, sinh, cot, y√x, x^y, 4, 5, 6, ×, cos, cosh, sec, 3√x, x^3, 1, 2, 3, -, =, tan, tanh, csc, √x, x^2, 0, ±, ., +, ncr, npr, %, log, 10^x, and a dropdown menu for units (Deg, Rad). The expression 2*10*(log2(10)) is entered in the input field.

$$100^2 = 10.000$$

$2 \times 100 \times \log_2(100) = \underline{1\,328.771237954945}$

The calculator interface shows the result 1328.771237954945 in the display. The keypad includes functions like 2nd, const, e, [::], x, (, , ,), ^, ^x, 7, 8, 9, ÷, C, sin, sinh, cot, y√x, x^y, 4, 5, 6, ×, cos, cosh, sec, 3√x, x^3, 1, 2, 3, -, =, tan, tanh, csc, √x, x^2, 0, ±, ., +, ncr, npr, %, log, 10^x, and a dropdown menu for units (Deg, Rad). The expression 2*100*(log2(100)) is entered in the input field.